


口服抗凝血劑**共同**特性




可有效預防
心房顫動相關**中風**



出血風險
由於所有抗凝血劑皆會延長
血塊形成的時間，因此可能
發生這種副作用

口服抗凝血劑**個別**特性

用藥無飲食限制，但服藥方式很多種
服藥方式分為空腹吃、飯中吃(隨餐)、飯後吃
若服藥後有不適感，可改為**飯中吃**，能減緩不舒服



空腹吃

飯前1小時或
飯後2小時服用

飯中吃

吃飯中途吃藥或
餐後立即服藥


飯後吃

飯後半小時
至1小時吃藥

專一反轉劑

能在您需要**緊急手術或重大出血時**，
提供及時回復凝血功能效果。

當心房顫動患者需要
立即停止抗凝血劑作用時，
凝血功能回復的速度與比例，
將決定心房顫動的患者是否陷於危險



過往反轉抗凝血功能
需等待15小時，現在有
專一反轉劑
能立即反轉凝血效果

為有效預防心房顫動引起的**中風與栓塞**，
並能在**緊急手術或重大出血時**
及時回復凝血功能


請與醫護人員討論您的偏好，
讓他們可以參考您的偏好，
決定最適合的治療。



心房顫動

衛教指南

心房顫動 代表您的心律不規則！




正常心律



心房顫動患者的心律
異常且不規則

心房顫動中風風險成因



常見症狀

如心悸、暈眩、胸悶

但有高達 75% 心房顫動患者卻完全沒有症狀！


若有任何疑慮請盡早至醫院檢查




年輕族群的患者應考慮中風風險逐年累積 年長者為高危險族群應提高警覺！



心房顫動的病人，隨著時間推移
10年內，6個人有1人會中風




心房顫動患者中風機率較常人高出5倍！



中風則可能導致 60% 的患者持續性失能使得生活起居無法自理，甚至造成 20% 的患者死亡

降低中風風險 服用口服抗凝血劑

① 抗凝血劑是一種用來預防血栓形成的藥物



② 研究已證實抗凝血劑可延緩並減少心房顫動患者心臟中的血栓形成，進而降低心房顫動相關中風風險！