

我有心臟衰竭
可以吃新冠的抗病毒藥物
Paxlovid嗎？

奇美醫院 李美娟藥師

2022/05/28

Paxlovid是由兩種抗病毒藥物 Nirmatrelvir 和 Ritonavir組成，腎功能正常的病人每次需服用 Nirmatrelvir 2顆和ritonavir 1顆，需早晚服用。腎功能不全病人則需Nirmatrelvir 1顆和Ritonavir 1顆，也是需早晚使用。研究顯示Paxlovid在具有重症危險因子的病人可以降低死亡率和住院風險。Paxlovid雖然有效，但不是人人都適合使用。主要的原因是因為Paxlovid與許多藥物有交互作用，會影響需多藥物的療效。

心臟衰竭病人長期服用的藥物中，抗心律不整的藥物臙得樂(Amiodarone)、毛地黃(Digoxin)，若和Paxlovid一起併用，臙得樂(Amiodarone)與毛地黃(Digoxin)的濃度都會增加，會讓病人產生心跳過慢等相關藥物副作用發生。降血壓的藥物Amlodipine療效也會受到Paxlovid影響，若需要併用則需降低50%劑量，然而有許多降血壓的複方藥物中也都含有Amlodipine，若要進行藥物調整難度會上升。此外若有在服用降血脂藥物的病人，也須特別注意，大部分的降血脂藥物也是不適合與Paxlovid一起使用的。再加上若是有合併心房顫動，使用抗凝血劑的病人，抗凝血劑療效會上升，可能會讓病人暴露在出血的風險中。

新冠確診人數節節上升，我們除了帶好口罩，勤洗手，保護自己也保護身邊的人。但即使如此小心謹慎，目前omicron感染力強，一不小心仍有確診的可能。若確診需要藥物做治療，在看診時務必告知醫師目前在服用的所有藥物，讓醫師做完整的評估，讓抗病毒藥物達到最大的療效，也讓我們的心衰藥物在疫情期間持續保護我們的心臟。